

Sf. 1/1/2017

Speech-language services for cleft palate by developmental stage

Dịch vụ ngôn ngữ trị liệu cho bệnh nhân hở vòm miệng trên theo lứa tuổi phát triển

Giai đoạn phát triển	Dịch vụ ngôn ngữ trị liệu
Trẻ mới đẻ (sau sinh — 4 tuần tuổi)	Khuyến khích nuôi dưỡng gần như bình thường Hỗ trợ gia đình
Trẻ nhũ nhi (1-12 tháng tuổi)	Đánh giá vấn đề cho trẻ ăn uống Giáo dục gia đình về ảnh hưởng của hở vòm miệng lên phát âm Bắt đầu đánh giá chức năng ngôn ngữ-lời nói và có biện pháp can thiệp sớm
Trẻ lứa tuổi nhà trẻ (1-5 tuổi)	Đánh giá vấn đề cho trẻ ăn uống Tăng cường đánh giá chức năng ngôn ngữ lời nói và bắt đầu can thiệp trực tiếp
Trẻ lứa tuổi bắt đầu đi học (5-13 tuổi)	Đánh giá vấn đề cho trẻ ăn uống Tiếp tục đánh giá chức năng ngôn ngữ bao gồm đánh giá chức năng hầu họng
Thanh thiếu niên (13-18 tuổi)	Lượng giá vấn đề cho ăn uống Đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ, bao gồm nhận thức của trẻ về nhu cầu chữa trị
Người lớn (18 tuổi trở lên)	Cung cấp dịch vụ ngôn ngữ trị liệu tùy theo nhu cầu của bệnh nhân