

Giới thiệu bại não

Phạm Thùy Giang
Chuyên gia âm ngữ trị liệu

Bại Não

- Rối loạn vận động cơ cố định do não bị tổn thương khi mang thai, khi sinh, hoặc sau khi sinh
- Mức độ nhẹ đến nặng
 - ~16 / 5.000 người bị bại não
 - ~30% người bại não bị chậm trí tuệ
 - ~33% người bại não bị động kinh



Loại Bại Não

- 65 – 80% co cứng (spastic): bắp cơ co lại không kiểm soát được
- 12% múa vờn (athetosis): tay chân quằn quại không kiểm soát được
- 12% cứng rắn (rigidity): bắp cơ quá co làm cho bắp cơ cứng và không uyển chuyển được
- 7% mất điều hòa (ataxia): khó phối hợp vận động để giữ thăng bằng

Trẻ Em Bại Não



Dự án GD Đại học II-Khoa GDDB- ĐHSPPH

Ảnh Hưởng Đến Lời Nói

- Tất cả các bắp cơ hô hấp và phát âm đều có thể bị ảnh hưởng
- Khó điều chỉnh bắp cơ hô hấp để nói câu dài
- Giọng nói có thể to nhỏ bất ngờ
- Bắp cơ miệng lưỡi có thể khó điều chỉnh để phát âm
- Bắp cơ mặt và đầu có thể khó giữ yên.